

**Инструкция**  
(информация для потребителя)  
по медицинскому применению препарата

**ИНГАЛИПТ**

**Регистрационный номер:** ЛСР 000073-22-05-07

**Торговое наименование:** Ингалипт

**МНН:** нет

**Лекарственная форма:** спрей для местного применения

**Состав**

в 100 мл препарата содержится:

*Активные вещества:* сульфаниламид (*стрептоцид*) 2,5 мг, сульфатиазол натрия, эвкалипта листьев масло 0,05 мг, мяты перечной листьев масло 0,05 мг, тимол 0,05 мг.

*Вспомогательные вещества:* глицерол 7,0 г, сахароза (сахар-рафинад) 5,0 г, полисорбат-80 (твин-80) 3,0 г, этанол 95% 6,0 г, вода до 100 мл.

**Описание:** прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное комбинированное средство.

**Код АТХ:** R02AA20

**Фармакологические свойства:**

Комбинированный препарат для местного применения.

*Фармакодинамика:* Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки. Тимол, эвкалиптовое масло и мяты перечной листьев масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

*Фармакокинетика:* препарат образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты: сульфаниламид и сульфатиазол. Оба препарата связываются с белками крови: сульфаниламид натрия на 12-14%, сульфатиазол натрия на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида составляет 10 час., норсульфазола-натрия 1-2 час.

**Показания к применению**

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, гортани и носоглотки: тонзиллит, фарингит, афтозный и язвенный стоматит.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов, эфирных масел или других компонентов препарата.

**Способ применения и дозы**

Перед орошением рот и глотку прополаскивают теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью тампонов удаляют некротический налет.

Устанавливают насадку под углом 90° к флакону. Конец насадки вводят в полость рта и нажимают на головку клапана микродозатора 3-4 раза, направляя поток жидкости на обрабатываемые участки. Орошение производят 4-5 раз в сутки через 2-3 часа.

Во избежание засорения распылителя рекомендуется после применения протереть его, либо промыть

кипяченной водой.

**Побочное действие**

Возможны индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты препарата, кратковременное ощущение жжения или першения.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Системные эффекты при использовании данного препарата по назначению маловероятны, что позволяет одновременно применять другие лекарственные средства без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.

**Форма выпуска**

Спрей для местного применения (флаконы-спреи полиэтиленовые) по 25, 30, 50 мл.

По 1 флакону-спрею, вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

1 год.

Не использовать после срока, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5° до 25°С, в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

000 «ДАВ Фарм», Россия

115184, Москва, Большая Татарская д. 35, стр. 1

Тел. (495)627-11-20; 627-11-21

Претензии по качеству предъявлять по телефону, указанному выше

